



SHK CALCIUM 18

FICHA TECNICA

Fertilizante Foliar

SHK CALCIUM 18

RSCO: 186/IX/18

SHOKUBUTSU AGRO SA DE CV

DESCRIPCION

SHK CALCIUM 18 es un producto a base de Calcio (Ca) de aplicación foliar, formulado con componentes especiales que aumentan la absorción, la penetración y la traslocación a los puntos de crecimiento (ápices vegetativos, flores, frutos, ápices de las raíces) en tiempo muy corto que las formulaciones convencionales no pueden hacer. Es un producto sistémico, basipétalo y acropétalo, la absorción es muy rápida y no va más allá de 2 horas de su aplicación.

Nombre del Producto	SHK CALCIUM 18
Ingrediente Activo	Calcio (Ca), Amino Ácidos Libres Tipo L
Concentración:	18.0%, 32.9% Respectivamente P/P
Nombre Químico	Oxido de Calcio (CaO), Amino Ácidos
Tipo de Formulación	Polvo Soluble
Categoría Toxicológica	No es plaguicida
Franja Toxicológica	No es plaguicida
Cultivos Registrados	Solanáceas: Tomate, Chile, Pimientos, Berenjena, Papa, Tomatillo, Tabaco. Cucurbitáceas: Pepino, Melon, Sandia, Calabaza, Chayote. Crucíferas: Col, Coliflor, Brócoli, Col de Bruselas, Nabo, Napa, Rábano, Pak Choi. Gramíneas: Maiz, Sorgo, Cebada, Trigo, Arroz, Caña de Azúcar, Centeno, Triticale. Leguminosas: Frijol, Soya, Chícharo, Garbanzo, Haba, Lenteja, Jícama, Cacahuete, Tamarindo. Liliáceas: Ajo, Cebolla, Cebollín, Cebollín Chino. Forrajes: Alfalfa, Pasto, Trébol. Frutales Templados: Durazno, Pera, Manzana, Ciruelo, Cereza, Membrillo, Frambuesa, Zarzamora, Arándano, Guayaba, Aguacate. Cultivos Áridos y Semiáridos: Agave, algodón, Nogal, Nopal, Olivo, Pistacho, Vid. Frutales tropicales: Cítricos, Banano, Mango, Papayo, Café, Mangostán, Rambután. Ornamentales: Flores y Plantas de Ornato. Otros: Lechuga, Apio, Espinaca, Cilantro, Esparrago, Piña, Fresa, Zanahoria.
Destinos Biológicos	Fertilizante Foliar para Cultivos de Campo Abierto y Cultivos Bajo techo (Invernaderos, Mallas, Mallas Sombras, Micro y Macrotuneles).
Dosis/ha	250 a 2,000 g/ha
Presentaciones	250 g, 500 g y 20 kg

MODO DE ACCION

Corrige la deficiencia de Calcio (Ca) en los cultivos; disminuye el impacto de los desbalances hídricos ocasionados por calor, frío, sales, vientos, sequías y otros factores ambientales; SHK Calcium 18 acelera la desintoxicación de las plantas ocasionada por químicos; vuelve más tolerante a las plantas a las enfermedades; mejora la vida de anaquel de las frutas y verduras; mejora la germinación de las semillas producidas en plantas con buenos suministros de Calcio; mejora la polinización de las flores en condiciones ambientales adversas, mejora la velocidad de recuperación a las bajas extremas de temperatura (heladas) e incrementa el desarrollo de las plantas bajo condiciones de estrés por bajas temperaturas.

MECANISMO DE ACCION

Actúa fortaleciendo la pared celular como cementante de las fibras de lignina, celulosa y hemicelulosa contenidas en la pared, actúa en la membrana plasmática volviendo a este altamente selectiva al ingreso de compuestos al citoplasma, induce el cierre de las estomas en condiciones de muy bajas temperaturas, desempeña un papel muy importante en la Calmodulina la cual controla las actividades metabólicas de las plantas.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	DOSIS (g/ha)	EPOCA DE APLICACIÓN	I. C. (Días)	T. R. (Horas)
GRANOS Y SEMILLAS: Frijol, Lenteja, Soya, Garbanzo, Haba, chícharo, Cacahuete, Maíz, Sorgo, Trigo, Avena, Cebada, Arroz, Centeno, Triticale, Ajonjolí, Girasol.	500 a 2,000	-Deficiencias de Calcio (Ca). -Al inicio de Floración. -Al inicio de desarrollo del grano. -Presencia de altas temperaturas y bajas temperaturas. -Intoxicaciones por plaguicidas. -Sales en el suelo.	0	>1
HORTALIZAS: Tomate, Papa, Chile, Berenjena, Tomatillo, Sandía, Melón, Pepino, Chayote, Calabacita, Brócoli, Coliflor, Col, Col de Bruselas, Rábano, Napa, Lechuga, Endivia, Espinaca, Apio, Cilantro, Zanahoria, Ajo, Cebolla, Poro, Esparrago, Jícama, Camote y Otras	250 a 1,000	-Deficiencias de Calcio (Ca). -Al inicio de Floración. -Presencia de altas temperaturas y bajas temperaturas. -Intoxicaciones por plaguicidas. -Sales en el suelo.	0	>1
FRUTALES: Arándano, Frambuesa, Zarzamora, Fresa, Manzano, Durazno, Peral, Ciruelo, Chabacano, Nectarina, Tejocote, Guayaba, Aguacate, Vid, Nogales, Olivo, Almendra, Mango, Banano, Café,	500 a 2,000	-Deficiencias de Calcio (Ca). -Al inicio de Floración. -Presencia de altas temperaturas y bajas temperaturas. -Intoxicaciones por plaguicidas. -Sales en el suelo.	0	>1



SHK CALCIUM 18

Cacao, Naranja, Lima, Limón Mexicano, Mandarina, Toronja, Limón italiano, Limón Persa, Piña y otros				
CACTUS Y AGAVES: Pitaya, Pitahaya, Nopal Tunero, Nopal Verdura, Xocoxotle, Agave Tequilero, Agave mezcadero, Agave Pulquero,	500 a 2,000	Deficiencias de Calcio (Ca). -Presencia de altas temperaturas y bajas temperaturas. -Intoxicaciones por plaguicidas. -Sales en el suelo.	0	>1

I. C. = Intervalo a Cosecha. Intervalo de seguridad (días) entre la última aplicación y la cosecha.

T. R. = Tiempo de reentrada. Es el periodo de tiempo (Horas) para el reingreso de los trabajadores al área tratada.

N/A = No Aplica.

FRECUENCIA Y EPOCAS DE APLICACIÓN

Granos: Las primeras aplicaciones se realizarán en cuanto la planta manifieste deficiencias de Calcio (Ca); en cuanto se esté iniciando la floración, polinización y amarre; en cuanto se inicie el desarrollo de los granos, en caso de altas temperaturas ambientales, bajas temperaturas o nublados que alteren el desarrollo normal del cultivo; en caso de intoxicaciones ocasionadas por plaguicidas y desbalances hídricos ocasionados por sales. Se realizan aplicaciones múltiples con intervalos semanales, 10 y 15 días dependiendo de la situación ambiental predominante.

Hortalizas: Las primeras aplicaciones se realizarán en cuanto la planta manifieste deficiencias de Calcio (Ca); en cuanto se esté iniciando la floración, polinización y amarre (Hortalizas de Fruto); en hortalizas de hoja o flores iniciar las aplicaciones 30 a 40 días antes de la floración o bien el mismo periodo antes de cosecha; en caso de altas temperaturas ambientales, bajas temperaturas o nublados que alteren el desarrollo normal del cultivo; en caso de intoxicaciones ocasionadas por plaguicidas y desbalances hídricos ocasionados por sales. Se realizan aplicaciones múltiples con intervalos semanales, 10 y 15 días dependiendo de la situación ambiental predominante.

Frutales: Las primeras aplicaciones se realizarán en cuanto la planta manifieste deficiencias de Calcio (Ca); iniciar a aplicar 30 a 40 días antes de iniciar la floración y continuar las aplicaciones cada 7 a 10 días; Una vez que se presente la floración realizar aplicaciones con intervalos de 10 a 15 días para la polinización óptima y amarre adecuado de los frutos. en caso de altas temperaturas ambientales, bajas temperaturas o nublados que alteren el desarrollo normal del cultivo; en caso de intoxicaciones ocasionadas por plaguicidas y desbalances hídricos ocasionados por sales. Se realizan aplicaciones múltiples con intervalos semanales, 10 y 15 días dependiendo de la situación ambiental predominante.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDA

Este producto no es fitotóxico a las dosis aquí recomendadas y en los cultivos aquí señalados. Este producto se puede mezclar con la mayoría de los agroquímicos, con excepción de aquellos con reacción alcalina, sin embargo, se le recomienda al usuario hacer una prueba de compatibilidad con los productos de la mezcla planeada para observar los aspectos físicos de la mezcla y las reacciones sobre las plantas tratadas y asegurarse que no hay reacciones fitotóxicas sobre el cultivo.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Primeramente, tomar el envase y colocarlo de manera vertical, seguido de esto quitar la tapa rosca que está fabricada con una parte cortante en su parte superior para cortar el sello de garantía, voltear la tapa rosca y con la protuberancia cortante cortar el sello de seguridad completamente y está listo para vaciar el contenido del producto:

Pre Mezcla. Vaciar el contenido del envase en una cubeta de 19 litros conteniendo 10 litros de agua y proceder a mezclar perfectamente el producto con el agua hasta formar una solución uniforme sin precipitado. Una vez realizada la mezcla se procede a vaciar el contenido de la cubeta a el contenedor del aspersor, manteniendo en el aspersor la agitación constante.

Aplicaciones foliares. Calibrar el equipo de aspersión para conocer la cantidad de agua que el equipo asperja por hectárea. Una vez que se conoce la cantidad de agua/hectárea entonces se procede a agregar la dosis de producto por hectárea y se procede a aplicar.

Cabe señalar que para las aplicaciones foliares se va a requerir adicionarle un agente dispersante a la mezcla para una mejor cobertura.

Una vez vaciado el producto al agua que se usara como mezcla de aplicación, realizar el triple lavado a el envase para que no se queden residuos del producto en el mismo.

Mantener la mezcla en aplicación constante cuando sean aplicaciones foliares principalmente.

Mantener la presión del equipo de aspersión para una mejor cobertura.

PRECAUCIONES

- Lea la etiqueta antes de usar el producto
- Mantenga el producto bajo llave fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto separado de bebidas y alimentos.
- No coma, beba o fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y/o para reingresar al área tratada antes que se cumpla el periodo de reentrada.
- En el caso no consumir la totalidad del producto, consérvelo en el envase original cerrado y etiquetado.

OBSERVACIONES AMBIENTALES

- Evite verter este producto por los canales de aguas, lluvias o al suelo.
- No contamine las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado.
- No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión hacia zonas no objetivo como canales, aguas corrientes o lagos.
- Para aplicación aérea y terrestre, respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente con relación a los cuerpos de agua.



SHK CALCIUM 18

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación, perfore el recipiente y entregue a Campo Limpio, nuestro Programa de Manejo Responsable de Envases Vacíos.

SINTOX

SERVICIO DE INFORMACION TOXICOLOGICA

TELS: (55) 55986659, 56112634

LADA 01(800) 0092800

SHOKUBUTSU AGRO SA DE CV

Arcos de Villagran 231

Rincon de los Arcos

36633, Irapuato, Gto.

Tel. +52 (462) 135 5110

+52 (462) 482 9743

E-mail: atencionclientes@shkagro.com